


แนวทางการเลือกใช้ยาเพื่อรักษาโรคกระดูกพรุน



*การตอบสนองต่อ Bisphosphonates/ Denosumab ไม่ดี ประเมินการตอบสนองอย่างน้อยทุก 6 เดือน และจนได้รับยามากกว่า 1 ปี

1. มีกระดูกหักจากอุบัติเหตุเล็กน้อย 2 แห่งเป็นต้นไป (ประเมินตาม clinical indication)
2. มีกระดูกหักจากอุบัติเหตุเล็กน้อย 1 แห่งร่วมกับมวลกระดูกลดลงมากกว่า 2 % ที่หลัง หรือ 3 % ที่ต้นขา หรือ ค่า CTX ลดลงไม่ถึง 50 % จาก baseline (BMD ทำไม่เร็วกว่า 12 เดือน)
3. ไม่มีกระดูกหักใหม่ แต่มีมวลกระดูกลดลงมากกว่า 2 % ที่หลัง หรือ 3 % ที่ต้นขาและค่า CTX ลดลงไม่ถึง 50 % จาก baseline baseline (BMD ทำไม่เร็วกว่า 12 เดือน)

สีเขียว หมายถึง ยา E สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ อาจเป็นยาที่เลือกใช้ก่อน
สีเหลือง หมายถึง ยา P หรือ ยา OCPA ที่ตรงข้อบ่งชี้สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ
สีแดง หมายถึง ยา E, P, PP, OCPA ,@ ไม่ตรงข้อบ่งชี้ผู้ป่วยต้องชำระเงินเอง

หมายเหตุ : — ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)
= ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non - ED)